Table 1. Baseline and Clinical Characteristics and of the Matched Patients between Triptan Group and Standard Care Group

Characteristics	Triptan (n=3,719)	No triptan (n=3,719)
Median age (IQR)	55 (44-63)	56 (46-64)
Female	3,028 (81.42%)	3,029 (81.45%)
Race		
White	3,339 (89.78%)	3,352 (90.13%)
Other	380 (10.22%)	367 (9.87%)
Type of migraine		
Chronic migraine	1,241 (33.37%)	1,176 (31.62%)
With aura	1,047 (28.15%)	993 (26.70%)
History of cardiovascular disease	672 (18.07%)	622 (16.73%)
History of cerebrovascular disease	265 (7.13%)	209 (5.62%)
History of transient cerebral ischemic attacks	165 (4.44%)	137 (3.68%)
Vascular risk factors		
Diabetes	1,017 (27.35%)	995 (26.76%)
Overweight/obesity	2,299 (61.82%)	2,326 (62.54%)
Hyperlipidemia/ Hypercholesterolemia	2,644 (71.09%)	2,662 (71.58%)
Alcohol related disorders	469 (12.61%)	469 (12.61%)
Nicotine dependence	911 (24.50%)	926 (24.90%)
Sleep apnea	1,602 (43.08%)	1,585 (42.62%)
Primary and secondary hypertension	1,775 (47.73%)	1,854 (49.85%)
Peripheral vascular disease/atherosclerosis	450 (12.10%)	419 (11.27%)